

مخدر الحشيش يضاعف فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية (دراسة)



الأحد 12 مارس 2017 08:03 م

حذرت دراسة أمريكية حديثة، من أن تعاطي الحشيش، يمكن أن يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية []
الدراسة أجراها باحثون بمركز أينشتاين الطبي، في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، ونشروا نتائجها اليوم الأحد، وعرضوا نتائجها أمس، أمام
اجتماع الكلية الأمريكية لأمراض القلب في واشنطن []

وللوصول إلى نتائج الدراسة، حلل فريق البحث بيانات أكثر من 20 مليون شخص، يبلغ متوسط أعمارهم 18 إلى 55 عامًا، ودخلوا أكثر من
ألف مستشفى بالولايات المتحدة بين عامي 2009 و2010.

ووجد فريق البحث أن 316 ألف شخص، يمثلون 1.5% ممن أجريت عليهم الدراسة تعاطوا الحشيش []

ووجدوا أيضًا أن الأشخاص الذين تعاطوا الحشيش زادت لديهم فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 26%، والنوبات القلبية بنسبة 10%
عن غيرهم، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار عوامل خطر أخرى مثل السمنة، والكحول والتدخين []

وقال قائد فريق البحث الدكتور أديتي كالا: "إن الحشيش يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، خاصة لدى المرضى الذين
يعانون من السمنة".

وأضاف أن "الأبحاث تشير إلى أن هناك شيئًا جوهريًا يسببه الحشيش، يمكن أن يعطل عمل قلب الإنسان".

وكشفت أبحاث سابقة عن وجود صلة وثيقة بين تعاطي المراهقين للحشيش، وارتفاع معدلات إصابتهم بالأمراض العقلية الخطيرة، خاصة
انفصام الشخصية وفقدان الذاكرة، مقارنة بنظرائهم الذين لا يتعاطون الحشيش []

وأظهرت أن تدخين مخدر الحشيش بانتظام، قد يخفّض كثافة العظام، ويجعل الأشخاص أكثر عرضة لكسور العظام، لأن مكوناته يمكن أن
تؤثر على وظيفة خلايا العظام []

والحشيش أو الماريجوانا هي خليط من أوراق نبات القنب الهندي وبذوره وأزهاره، وهو نبات ذو تأثيرات مخدرة ينتشر في البلدان العربية
بعدة أسماء مختلفة منها الحشيش والبانجو والزطلة والكيف والشاراس والجنزفوري والغانجا والحقبة والتكروري والبهانك والدوامسك
وغيرها، وتؤثر كل أشكال الماريجوانا تأثيرًا مباشرًا على كيفية عمل الدماغ، كما تؤثر أيضًا في مركز الجهاز العصبي كمادة مهلوسة []